Anxiété généralisée

Résumé des critères du DSM-5

Anxiété et soucis excessifs pendant au moins 6 mois concernant plusieurs évènements ou
activités (ex. : travail, école, etc.).
Difficulté à contrôler ses préoccupations
Anxiété associée à au moins 3 des symptômes suivants, dont plusieurs sont présents depuis
au moins 6 mois :
Note : un seul symptôme est requis chez l'enfant.
☐ Agitation ou sensation d'être survolté ou à bout.
☐ Fatigabilité
☐ Difficultés de concentration ou trous de mémoire
☐ Irritabilité
☐ Tension musculaire
☐ Perturbation du sommeil (ex. : difficultés d'endormissement ou sommeil interrompu ou
sommeil agité non satisfaisant).
L'anxiété et ses symptômes entrainent une détresse ou une altération significative du
fonctionnement social, professionnel, scolaire ou autres domaines importants.
Perturbation non imputable aux effets physiologiques d'une substance ou d'une autre
affection médicale.
Perturbation pas mieux expliquée par un autre trouble mental, ex. : trouble panique,
anxiété sociale, TOC, anxiété de séparation, TSPT, anorexie, trouble à symptomatologie
somatique, dysmorphie corporelle, schizophrénie, trouble délirant, etc.
Notes:

Outils-psy.com ©2024 Outils Psy